

## RI 検査の前処置・注意事項について

各種 RI 検査には、前処置や禁止薬品等、注意事項を有する場合があります。

代表的な検査について記しましたので、どうぞ参考にしてください。

質問等がありましたら弘前市立病院・放射線科 RI 担当までお願いします。  
(0172-43-3211・内線236にて、RI 担当をお尋ねください。)

◎骨シンチ・・・撮像の直前に排尿する。その他の制約は無し。

◎ダットスキャン・・・一部薬品（三環系抗うつ剤など）は不可。投薬時には医師の判断を。  
また、飲酒に強い反応を示す患者の場合も医師の判断を仰いでください。  
(ダットスキャン注はアルコール5%を含んでいます)

◎脳 ECD シンチ・・・特に無し。

◎MIBG シンチ・・・一部薬品（三環系抗うつ剤など）は不可。投薬時には医師の判断を。

◎肺 MAA シンチ・・・特に無し。

◎腎動態シンチ・・・特に無し。

◎腎静態シンチ・・・特に無し。

◎ガリウムシンチ・・・次ページの「ガリウムシンチの前処置について」を参照してください。

また、ガリウムシンチの場合は、RI 薬品の注射日に患者さんと病院スタッフ用の説明文を印刷して、ご本人にお渡ししています。  
最後のページに見本がありますので、参考にしてください。

## 「ガリウムシンチの前処置について」 ※病院スタッフ用

ガリウムシンチは、RI 薬品を注射してから、2－3日後に撮影を行う検査となります。きちんとした撮影を行うため、次の指示をお守りください。

### 『薬品の注射日まで、薬品の注射日から撮影日の前日まで』

特に制約無し。

### 『撮影日の前日から』

撮影日前日の朝食より、検査食（大腸検査用の低残さ食）に切り替えてください。

ガリウムシンチ用の RI 薬品が大便中に排泄される性質を持つので、なるべく腸内をきれいにしたい、という理由からです。腸内に便が残っていると読影に支障が出る場合があります。

※入院中の方は、入院先の各病院にて検査食を準備してください。

※外来の方は、依頼元の病院側で準備して頂くか、もしくは、市立病院の 1F 売店で検査食を購入して頂きます。

市立病院で販売されている検査食の例

NEW サンケンクリン 1296円（8%税込み）※H28.3.31 現在

また、撮影日前日の午後9時に、下剤を飲んで頂きます。ピコルーラ4錠、プルセニド2錠、いずれかを目安に、検査指示医師の判断と各病院での処方をお願いします。

※空腹が我慢できない方は、ミルク無しの紅茶、飴、実の入っていないジュース、コーラやサイダー等の清涼飲料水であれば飲食しても構いません。牛乳などの乳製品は避けてください。

### 『撮影日当日』

検査が終わるまでは、食事をしてはいけません。（飲水は可です。）

また、当日の朝に、浣腸の指示が出ることがあります。

こちらの有無については担当医師の判断によるので、確認してください。

検査が終わった後からは、制約が無くなります。お疲れさまでした。

RI 検査前処置（ガリウムシンチ）（見本） ※患者さん用  
※実際は患者名や日にちが入ります。

お名前      ○○    ○○様

検査の前に、腸の中をきれいにしなければなりません。次の指示を守ってください。

1. ○月○日（検査前日）朝より検査食に切り替えてください。  
（検査食は依頼元病院で準備するか、市立病院売店にて購入してください。）  
※市立病院売店・・・サンケンクリン食 約1300円
2. ○月○日（検査前日）午後9時を目安に下剤を飲んでください。  
（ピコルーラ4錠 or プルセニド2錠）いずれか  
（検査指示医が判断し、依頼元病院から処方されるはずです）

空腹で我慢できない方は、次の中から自由に食べてください。  
ミルクを入れない紅茶、飴、実のっていないジュース、コーラやサイダーなどの清涼飲料水。

注意①牛乳などの乳製品は食べてはいけません。

②下剤が良く効くように、水をたくさん飲んでください。

（○月○日）検査当日朝に浣腸の指示があることもあります。

3. （○月○日）検査当日の朝食は、検査終了後をお願いします。

弘前市立病院 放射線科